

Numéro d'identification du participant _____

Date _____

S'agit-il d'une évaluation avant ou après la formation ? (Encerclez l'une des réponses.)

- a. Évaluation avant la formation
- b. Évaluation après la formation

INSTRUCTIONS : Pour chaque question, encerclez la meilleure réponse

1. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) en votre capacité à effectuer l'examen rapide de l'OMS chez une femme suspectée de travail prolongé ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e
2. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à effectuer l'évaluation des 4 P (Patient - Puissance - Passager - Passage) chez les femmes suspectées de travail prolongé ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e
3. Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre capacité à identifier les femmes présentant une dystocie ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e
4. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à identifier les malpositions et les mauvaises présentations qui nécessitent une césarienne ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

5. Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre capacité à fournir des soins pré-référentiels / préopératoires aux femmes en travail ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

6. Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre capacité à identifier et à prendre en charge une infection utérine pendant le travail ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

7. Dans quelle mesure avez-vous confiance en votre capacité à annoncer l'absence de bruits cardiaques fœtaux aux mères/parents et à leur fournir des soins et un soutien émotionnels ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

8. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à surveiller et à prendre en charge les femmes ayant un travail prolongé ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

9. Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre capacité à prescrire une perfusion d'ocytocine pour accélérer le travail ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

10. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à calculer le taux de perfusion approprié pour une perfusion d'ocytocine pour accélérer le travail ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

11. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à surveiller les femmes recevant une perfusion d'ocytocine pour accélérer le travail et à gérer l'ajustement du débit de la perfusion en fonction des résultats de la surveillance ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

12. Dans quelle mesure avez-vous confiance en votre capacité à prendre en charge l'hyperstimulation lorsqu'une femme reçoit une perfusion d'ocytocine pour accélérer le travail ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

13. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à identifier une dystocie des épaules ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

14. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à diriger l'équipe chargée de la prise en charge de la dystocie des épaules ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

15. Dans quelle mesure avez-vous confiance en votre capacité à effectuer toutes les manœuvres pour prendre en charge la dystocie des épaules ?
 1. Pas du tout confiant/e
 2. Pas très confiant/e
 3. Assez confiant/e
 4. Très confiant/e
 5. Extrêmement confiant/e

16. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à examiner un nouveau-né à la recherche de blessures après une dystocie des épaules ?
 1. Pas du tout confiant/e

2. Pas très confiant/e
3. Assez confiant/e
4. Très confiant/e
5. Extrêmement confiant/e

17. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à distinguer correctement une présentation du siège complète ou décomplétée avec une tête fléchie ou en extension ??

1. Pas du tout confiant/e
2. Pas très confiant/e
3. Assez confiant/e
4. Très confiant/e
5. Extrêmement confiant/e

18. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à réaliser un accouchement spontané par le siège complet/décomplété ?

1. Pas du tout confiant/e
2. Pas très confiant/e
3. Assez confiant/e
4. Très confiant/e
5. Extrêmement confiant/e

19. Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans votre capacité à prendre en charge une tête bloquée ?

1. Pas du tout confiant/e
2. Pas très confiant/e
3. Assez confiant/e
4. Très confiant/e
5. Extrêmement confiant/e

20. Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) dans votre capacité à effectuer des manœuvres pour délivrer les fesses, les jambes ou les bras lorsqu'ils ne délivrent pas spontanément ?

1. Pas du tout confiant/e
2. Pas très confiant/e
3. Assez confiant/e
4. Très confiant/e
5. Extrêmement confiant/e