

OSCE 3: Apoyo en el
parto

Guía para leer a los participantes

- El propósito de esta actividad es evaluar la toma de decisiones de los participantes y sus habilidades mientras atiende a una cliente en un ambiente simulado.
- Para cada estación, suponga que usted se encuentra solo en un establecimiento de salud rural. Cuenta con todo el equipamiento y los insumos necesarios para un parto vaginal normal.
- Recibirá toda la información fundamental al inicio de cada estación de OSCE.
- Antes de comenzar, pida al evaluador que le explique cualquier duda que tenga. Una vez iniciada la OSCE, el evaluador solo le proporcionará información sobre el estado de la paciente.
- A partir del inicio de la OSCE, tendrá 4 minutos para completar esta estación.
- **Hable con la mujer que tendrá frente a usted y atiéndala tal como lo haría en la vida real. Incluso si al mismo tiempo soy el examinador y haciendo el rol de la mujer en trabajo de parto, hábleme como si fuera la mujer.**
- Sea explícito al verbalizar sus hallazgos clínicos y las decisiones que tome en consecuencia.
- Si administra un medicamento, debe explicar lo que está administrando, la dosis, la vía y por qué lo está administrando.

Instrucciones para el examinador

- **Asegure leer las instrucciones arriba mencionadas a los participantes.**
- **Organice los insumos para el parto de manera que la bolsa y la máscara estén separadas y que el uterotónico no haya sido extraído del frasco.**
- **Colóquese el simulador de parto, con el bebé en posición OA y listo para nacer.**
- **Solo observe. No intervenga en la demostración del participante.**
- **Los participantes deben realizar cada una de las acciones en cada paso para recibir el crédito por haber completado el paso correctamente.**
- **NO proporcione información sobre evaluaciones que los participantes no realicen.**
- **Espere para la retroalimentación hasta que todos los participantes hayan terminado la evaluación.**

Lea al participante lo siguiente: "Usted está solo en el centro de salud al comienzo del escenario.

Usted me ha estado monitoreando durante todo el trabajo de parto normal y en ese tiempo me explicó qué esperar durante el parto. Estuve de acuerdo con todos los medicamentos y los tratamientos que me recomendó para mí y para el bebé. De pronto, tengo gran necesidad de pujar. Mediante un tacto vaginal, usted confirma que tengo 10 cm de dilatación y comienza a preparar los insumos para el parto. Atiéndame por favor desde este momento hasta que nazca mi bebé".

*OSCE: Evaluación clínica estructurada objetiva por su sigla en inglés - Objective Structured Clinical Evaluation

Nombre del participante: _____ Fecha _____

**OSCE 3: Apoyo en el parto. Ayudando a las Madres a Sobrevivir
Cuidados esenciales en el trabajo de parto y el parto**

	ITEMS DE LA OSCE	Realizó según estándar_	NO realizó según estándar
	Tenga en cuenta que la lista de verificación es solo para la evaluación, no para capacitación	<u>Sí</u>	<u>No</u>
	<i>Nota: A través de la OSCE, evalúe el cuidado materno respetuoso (CMR). Observe la comunicación con usted, desde el punto de vista de la mujer. Los participantes deben ser respetuosos, apoyadores, deben informarle lo que están haciendo y por qué. Al finalizar, deberá calificar el CMR.</i>	<i>Marque la casilla apropiada para cada ítem</i>	
1.1	Carga 10 UI de oxitocina en una jeringa (o tiene listo 600 mcg de misoprostol por vía oral, si no dispone de oxitocina).		
1.2	Prueba la bolsa y máscara para el recién nacido.		
1.3	Se coloca un delantal limpio, una mascarilla, y protector para los ojos si está disponible.		
1.4	Se lava bien las manos con agua y jabón o usa desinfectante de manos a base de alcohol, y se coloca guantes estériles en ambas manos.		
1.5	Una vez que salió la cabeza, permite la rotación natural.		
1.6	Coloca al bebé sobre el abdomen de la madre.		
1.7	1) Seca al bebé rápidamente con una toalla/manta y 2) retira esa toalla o manta húmeda. (Cuando nace el bebé, indique que el bebé está respirando imitando el sonido de llanto).		
1.8	Coloca al bebé piel a piel sobre el abdomen de la madre y lo cubre con una toalla o una manta seca.		
1.9	Verifica si hay un segundo bebé.		
1.10	Administra 10 UI de oxitocina IM/IV (o 600 mcg de misoprostol por vía oral si no hay oxitocina disponible) y le explica a la mujer lo que le administra y por qué.		
1.11	Corta el cordón a los 1-3 minutos.		
1.12	Realiza tracción controlada del cordón solo durante las contracciones y mientras protege el útero.		
1.13	Evalúa el tono uterino inmediatamente después de la salida de la placenta.		
1.14	Inspecciona la placenta para verificar que esté completa.		
1.15	Verifica si hay sangrado.		
1.16	Verifica si hay algún desgarro genital.		
1.17	Brindó atención respetuosa y buena comunicación. Le explicó a usted (al evaluador que desempeña el rol de la mujer dando a luz) lo que iba a suceder y por qué, y le informó sobre los hallazgos.		

Puntaje ___/17

Puntaje para aprobar: 13/17

Aprueba/Desaprueba

(marque una con un círculo)