



**Helping Mothers
Survive**

**Ayudando a las Madres a Sobrevivir
Preeclampsia y Eclampsia
OSCE 2: Cuidados durante una convulsión**

Participante _____ Fecha _____

¿Es esta una evaluación pre- capacitación o post- capacitación? (Marque una) a. PRE b. POST

Cuidados durante y después de una convulsión – Verificación de habilidades

Instrucciones para el examinador

- Pida a un asistente que se recueste y simule una convulsión ecláptica durante los primeros 30 segundos del OSCE y que después se mantenga inmóvil.
- Los participantes deben tener acceso a los siguientes materiales: esfigmomanómetro y estetoscopio, termómetro, oxígeno, máscara y tubos, insumos para IV.
- Lea las instrucciones en *cursiva*, pero no intervenga en la demostración del participante
- La retroalimentación se realizará al final de la evaluación para todos los participantes.

Lea lo siguiente al participante: *La Sra. C tiene 26 años y ha dado a luz a término una niña saludable hace 4 horas. No ha tenido ningún problema durante el embarazo o el parto. Su esposo viene a buscarle y le comenta que la madre está sufriendo un dolor de cabeza intenso y no puede ver correctamente. Cuando usted llega, encuentra a la madre convulsionando. Muestre y verbalice lo que usted haría a continuación. Si durante el OSCE, Ud. decide realizar una evaluación, realice las mediciones correspondientes y se le darán los resultados. Si decide administrar una medicación, describa el tipo de medicación, concentración, dosis, vía de administración y el motivo por el cual utiliza esta medicación.*

	Lista de Verificación de Habilidades	SI	NO
		Actuó según el estándar	No actuó según el estándar
		<i>Señale Si/No en cada caso</i>	
2.1	Grita para pedir ayuda y moviliza a todo el personal disponible. Diga: <i>No hay personal disponible. ¿Qué haría a continuación para ayudar a la mujer?</i>		
2.2	Revisa vías aéreas y respiración. Diga: <i>Respiración 26</i>		
2.3	Vuelve a la mujer en su costado		
2.4	No intenta introducir ningún objeto en la boca de la mujer		
2.5	Toma presión arterial (152/112)		
2.6	Comienza oxígeno a 4–6 L/minuto. Si no lo dice, pregunte: <i>¿Qué concentración de oxígeno utilizará?</i>		
2.7	Indica y simula que comienza una infusión IV de suero salino o lactato Ringer		
2.8	Pregunte: <i>¿Cuál sería su diagnóstico?</i> (Eclampsia)		
2.9	Pregunte: <i>¿Qué haría usted a continuación?</i> El participante debe indicar que prepararía y administraría 4 g de sulfato de magnesio al 20% IV por 5 minutos.		
2.10	Indica que a continuación administraría 10 g de sulfato de magnesio al 50%, inyección IM profunda, 5 g en cada glúteo con 1 ml de lidocaína al 2% en la misma jeringa.		
2.11	Indica que administraría un antihipertensivo. El participante debe indicar el nombre, dosis y vía de administración. Cualquiera de las siguientes dosis de inicio es correcta: <ul style="list-style-type: none"> • Nifedipina 5 mg – 10 mg VO • Hidralazina 5 mg IV • Labetalol 20 mg IV 		

Puntuación _____/11

Aprueba SI / No (marque uno)

Puntaje de aprobación para “Cuidados durante una convulsión” = 8/11

