

Ayudando a las Mujeres y Bebés a Sobrevivir Preeclampsia y Eclampsia

PLAN DE ACCION 1 - CUIDADOS INICIALES

Evalue (si > 20 semanas de embarazo)



CLASIFIQUE

PREECLAMPSIA

TAd ≥ 90 o TAs ≥ 140 y ≥ 2 + proteinuria sin signos de alarma



Reevalúe

¿Normal?

Cuidados rutinarios

Si

No



Pida análisis laboratorio

¿Normal?

No

Si

Aumente el seguimiento

¿Estable?

No

Si

Confirme edad gestacional Parto a 37 semanas



Provea cuidados esenciales Continúe monitoreando

¿Resultados normales? No

Evalue continuamente signos de alarma

Evalue continuamente signos de alarma

PREECLAMPSIA SEVERA

TAd ≥ 110 o TAs ≥ 160 y ≥ 2 + proteinuria y Preeclampsia ≥ 1 signo de alarma




ECLAMPSIA

Convulsiones o Inconsciencia



Movilice al equipo

Administre dosis de carga de sulfato de magnesio (MgSO4) IV + IM



Administre medicación para reducir hipertensión


Busque cuidados avanzados

Ayudando a las Madres y Bebés a Sobrevivir Preeclampsia y Eclampsia

PLAN DE ACCION 2-CUIDADOS AVANZADOS

PREECLAMPSIA GRAVE

Preeclampsia y uno o más signos de alerta



ECLAMPSIA

Convulsiones o Inconsciencia




Recibir derivación o continuar cuidados

Iniciar o continuar $MgSO_4$

Iniciar o continuar medicación para reducir hipertensión severa

Continuar monitoreo de la mujer y el feto

si no hay convulsiones ni pérdida de consciencia



Confirme edad gestacional

si hay convulsiones o pérdida de consciencia

Parto

Continúe $MgSO_4$ durante 24 horas después del parto o desde la última convulsión

Continúe medicación para reducir hipertensión severa



Provea cuidados esenciales a la mujer y al recién nacido

Continúe monitoreo después del parto

Pre-viable

en 24 horas

Interrumpa el embarazo

Continúe $MgSO_4$ por 24 horas después del nacimiento o desde la última convulsión

Continúe monitoreo

Viable < 34 semanas



Administre dexametasona

Hospitalice a la mujer y monitoree:

- Convulsiones
- Hipertensión severa incontrolada
- Empeoramiento condición maternal (signos de alerta, evaluación, análisis de laboratorio)
- Empeoramiento del feto o muerte fetal
- El embarazo alcanza 37 semanas 0 días

≥ 34 semanas a < 37 semanas

> 37 semanas

en 24 horas

Si a alguno

En 4 horas

En 12 horas

