

Travail prolongé et dystocie mécanique

Évaluation rapide




Naissance imminente ?

Soutenir la naissance



Signes de danger/alerte
Rechercher des soins avancés

Évaluer



Classifier

Statut maternel et foetal rassurant
Voir Soins essentiels pour le travail et la naissance

Signes du travail prolongé
Fournir des soins généraux
Rechercher une fièvre >38.0°C

Signes de DCP / dystocie mécanique
Bras, front, mento-postérieure, transversale, siège décompleté mode des pieds
Soins pré-référence/préopératoires


Contraction inefficaces

Faible progression avec ≤ 2 contractions en 10 minutes, d'une durée de <40 secondes

Si pas d'ocytocine OU
Si pas dans un établissement offrant des SONU
Rechercher des soins avancés



Commencer l'ocytocine



Évaluer la femme, le bébé et la progression

Problèmes ?

Problèmes
Rechercher des soins avancés

Pas de problèmes

Continuer l'ocytocine et le suivi

Pas de problèmes
Reconnaître/prendre en charge la dystocie des épaules

Siège décompleté mode des fesses

La dilatation cervicale est plus lente que la normale si :

- 5 cm pendant ≥6 heures
- 6 cm pendant ≥5 heures
- 7 cm pendant ≥3 heures
- 8 cm pendant ≥2,5 heures
- 9 cm pendant ≥2 heures

Si pas dans un établissement offrant des SONU
Rechercher des soins avancés

Si dans un établissement de référence OU
Si la référence n'est pas possible



Évaluer la femme, le bébé et la progression

Problèmes ?

Problèmes
Rechercher des soins avancés pour accouchement par césarienne

Pas de problèmes

Continuer l'évaluation jusqu'à dilatation complète du col de l'utérus

Se préparer à aider le bébé à respirer



Effectuer des manœuvres pour faciliter l'accouchement par le siège

Soutenir la naissance

Surveiller étroitement la femme et le bébé



Continuer les soins

PRÉVENIR LES INFECTIONS

PRÉVENIR LES INFECTIONS

PRÉVENIR LES INFECTIONS

Fournir des soins respectueux

Fournir des soins respectueux

Fournir des soins respectueux